

碳酸钙维D₃元素片(4)说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】**通用名称：碳酸钙维D₃元素片(4)
英文名称：Calcium Carbonate, Vitamin D₃ and Elements Tablets(4)
汉语拼音：Tansuagail Wei D₃ Yuansu Pian(4)
- 【成份】**本品为复方制剂，每片含碳酸钙1.5克(相当于钙600毫克)、维生素D₃200国际单位、氯化铜1.252毫克(以铜计1.0毫克)、氧化镁82.89毫克(以镁计50毫克)、氧化锌9.337毫克(以锌计7.5毫克)、一水硫酸锰5.541毫克(以锰计1.8毫克)。辅料为：交联聚甲纤维素、微晶纤维素、硬脂酸镁、交联聚维酮、聚维酮K30、十二烷基硫酸钠、薄膜包衣预混剂(胃溶型)、轻质液状石蜡(包衣材料)。
- 【性状】**本品为暗玫瑰红色囊状薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色。
- 【作用类别】**本品为维生素与矿物质类非处方药药品。
- 【适应症】**用于成年人，特别是中、老年人和绝经后妇女的钙补充剂；并帮助防治骨质疏松症。
- 【规格】**本品为复方制剂，每片含钙600毫克、维生素D₃200国际单位、铜1.0毫克、镁50毫克、锌7.5毫克和锰1.8毫克。
- 【用法用量】**口服，一次1片，一日1次，饭后即服。
- 【不良反应】**1. 偶见嗝气、便秘。
2. 过量服用可发生高钙血症，偶可发生奶-碱综合征，表现为高血钙，碱中毒及肾功能不全(因服用牛奶及碳酸盐或单用碳酸盐引起)。
- 【禁忌】**高钙血症、高尿酸血症禁用。甲状旁腺功能亢进、结节病、肿瘤引起的溶骨、肾钙质沉着、严重的肾功能不全者禁用。维生素D过多症者禁用。
- 【注意事项】**1. 心肾功能不全者慎用。
2. 如服用过量或出现严重不良反应，应停药并立即就医。
3. 肾结石患者应在医师指导下使用。
4. 与任何补充剂一样，孕妇乳母服用前请咨询医师或药师。
5. 不要超过推荐剂量。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药品相互作用】**1. 本品不宜与洋地黄类药物合用。
2. 大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟，均会抑制钙剂的吸收。
3. 大量进食富含纤维素的食物会抑制钙的吸收，因钙与纤维素结合成不易吸收的化合物。
4. 本品与苯妥英钠类及四环素类同用，二者吸收减低。
5. 维生素D、避孕药、雌激素能增加钙的吸收。
6. 本品与噻嗪类利尿药合用时，因增加肾小管对钙的重吸收而易发生高钙血症。
7. 本品与含钾药物合用时，应注意心律失常。
8. 不应与含有大量镁、钙的药物合用，以免引起高镁、高钙血症。
9. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【药理作用】**钙是维持人体神经、肌肉、骨骼系统、细胞膜和毛细血管通透性正常功能所必需。维生素D能参与钙和磷的代谢，促进其吸收并对骨质形成有重要作用。
镁对维生素D的代谢及骨组织的功能很重要。它也作用于其它电解质、激素、生长因子、膜受体、信号通路、离子通道，还参与甲状旁腺激素的分泌与作用。
锌是许多金属酶的组成部分，是一种酶激活剂。锌的流失与软骨组织中硫酸软骨素的明显减少有关。
铜参与体内某些必要物质的合成，如结缔组织、骨骼和血管中的蛋白质，以及许多参与神经组织功能的神经活性物质。
锌在多核苷酸的转录及翻译中起重要作用，因此，对组织的恢复及生长是必要的。
- 【贮藏】**遮光，密闭，25℃以下干燥保存。
- 【包装】**白色高密度聚乙烯瓶装。7片/瓶；28片/瓶；30片/瓶；36片/瓶；60片/瓶；72片/瓶；100片/瓶。
- 【有效期】**24个月。
- 【执行标准】**YBH00292011
- 【批准文号】**国药准字H20110006
- 【说明书修订日期】**2024年04月01日
- 【药品上市许可持有人】**企业名称：赫力昂(苏州)制药有限公司 企业地址：江苏省苏州市宝带西路4号
- 【生产企业】**企业名称：赫力昂(苏州)制药有限公司 生产地址：苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园浦南路699号
邮政编码：215000 电话号码：0512-66055666
传真号码：0512-65258877 消费者热线：400-991-1165
网 址：www.caltrate.com.cn

如有问题可与生产企业联系。