

歐治鼻 噴鼻液0.05%

Otrivin Moisturizing Nasal Metered-Dose Spray 0.05%

衛署藥輸字 第 025186 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-01-22

去鼻塞噴劑

產品特性

歐治鼻(Otrivin)噴鼻液為澄清、無色、幾近無味的溶液，是一種去鼻塞藥品，可收縮鼻腔血管，迅速疏通堵塞的鼻子。本藥主成分xylometazoline是一種擬交感神經作用劑(非類固醇)，可快速的消除鼻腔的充血情況，讓呼吸更通暢。歐治鼻(Otrivin)用於鼻腔，以幫助消除鼻和咽喉附近區域之黏膜的充血。歐治鼻(Otrivin)亦有使用於幫助鼻鏡檢查及副鼻竇疾病的分泌物助流等。歐治鼻(Otrivin)約在5分鐘內開始作用，藥效可持續12小時之久。與其他去鼻塞藥品相較而言，本藥耐受性較好，不常發生反射性充血，即使是鼻黏膜較敏感的人也可使用，且濕潤配方含有濕潤成分使鼻腔舒適避免乾燥及不舒服。

歐治鼻直接作用於鼻腔黏膜，約在5分鐘內開始發揮效用，紓解鼻塞效果比口服去鼻塞藥物

Pseudoephedrine 或Phenylephrine的速度更快。口服含有Pseudoephedrine 或Phenylephrine的去鼻塞藥物約需30分鐘開始作用，因此在作用時間上，歐治鼻比口服去鼻塞藥更快速。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每毫升含xylometazoline hydrochloride 0.5mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate dodecahydrate, Disodium edetate, Benzalkonium chloride, Sorbitol, Methylhydroxypropylcellulose, Sodium chloride

2 用途(適應症)

暫時緩解因鼻炎、過敏性鼻炎、過敏或感冒引起之鼻塞、流鼻水症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 近期曾接受經鼻手術（通過鼻腔或口腔進行的腦部手術）的人。
3. 有狹角性青光眼（眼壓過高）的人。
4. 有慢性鼻發炎，且鼻道非常乾燥（乾燥性鼻炎或萎縮性鼻炎）的人。
5. 未滿3歲。
6. 孕婦。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 哺乳婦。
2. 有心臟疾病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、青光眼、因攝護腺肥大造成排尿困難、

或嗜鉻細胞瘤（一種罕見的腎上腺腫瘤，會製造過量的腎上腺素及正腎上腺素）的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 正在接受醫師治療的人。
2. 可能懷孕婦女。
3. 正在使用含鼻充血解除成分之藥品，如綜合感冒、鼻炎或抗過敏等藥品。
4. 正在服用以下抗憂鬱藥物的人：
 - 單胺氧化酶抑制劑(MAOI)：正在服用，或曾在最近兩週內服用。
 - 三環與四環抗憂鬱藥。

3.4 其他使用上注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量或使用次數，尤其是孩童及老人。
4. 若忘記使用，請勿同時使用二次用量。
5. 使用後症狀有改善，亦請勿連續使用本藥超過7天。過度頻繁使用或延長使用可能會造成再度鼻塞或鼻塞惡化。
6. 為避免交互感染，請勿與他人共用。
7. 本藥使用後可能會對鼻腔造成暫時的不適感，如乾燥、灼熱、刺痛、打噴嚏、或鼻分泌物增加。
8. 使用前，請先擤鼻涕。
9. 本藥對駕駛及操作機械的能力並無影響。
10. 若使用過量或誤食，請立即諮詢醫師或藥師。
11. 不要噴入眼睛或口腔。

4 用法用量

6歲以上未滿12歲	在家長監護下使用。每次於鼻腔內噴1-2下，每次須間隔8-10小時。每鼻孔每日不超過3下。
3歲以上未滿6歲	在家長監護下使用。每次於鼻腔內噴1下，每次須間隔8-10小時。每鼻孔每日不超過3下。
未滿3歲	請勿使用。

歐治鼻的定量噴頭可確保正確劑量完整分布到鼻黏膜表面，防止不小心用藥過量。

使用/操作指示

1. 請勿剪切噴嘴。此定量噴霧器在使用前已經是隨時可用的狀態。



2. 讓您孩童將鼻涕擤乾淨。
3. 打開瓶蓋。
4. 在第一次使用前，請先按壓噴霧幫浦4次。一旦使用過後，後續用藥的噴霧幫浦應都能正常使用。若未能正常噴霧或產品超過7天未使用，噴霧幫浦需再按壓2次。請特別小心不要噴入眼睛或口腔。
5. 以拇指頂在藥瓶底部及兩隻手指夾住噴嘴的方式直立握住藥瓶。



6. 您孩童的頭部微向前傾斜並將噴嘴插入鼻孔。按壓噴頭，同時讓孩童用鼻子輕輕吸氣。



7. 在另一鼻孔重複相同的步驟。
8. 使用後立即清潔噴嘴，待乾燥後蓋好瓶蓋。
9. 為避免感染散播，此噴霧劑僅可由同一人使用。

5 警語

- 5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢。
鼻腔	腫脹、刺激感。

- 5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

1. 鼻黏膜乾燥或刺激感、噁心、頭痛、投藥部位灼熱感。這些為常見副作用（每10人中可能有1人）。
2. 過敏反應（呼吸或吞嚥困難、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹）、看不清楚、心跳不規則或過快。這些為罕見副作用（每10,000人中可能有1人）。
3. 突然的強烈頭痛。
4. 如同一般的解鼻塞藥物，某些很敏感的使用者可能會出現睡眠困擾、昏眩、顫抖的症狀。若狀況很困擾，請諮詢您的醫師。
5. 使用後若持續鼻塞，或連續使用3天後症狀未改善或更惡化。

6. 若有上述外之其他不適情況產生。

6 包裝

100毫升以下塑膠瓶裝。

7 儲存方式

放在原包裝內，30°C以下乾燥處，避光避熱保存。

製造廠

GSK CONSUMER HEALTHCARE
SARL

ROUTE DE L'ETRAZ, 1260 NYON, SWITZERLAND

藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份
有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓