

普拿疼伏冒加強錠

PANADOL COLD EXTRA CAPLETS

衛署藥輸字 第 023784 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

伏冒加強錠的主要成分能在30分鐘之內發揮退燒及緩解鼻塞效果，有效制伏感冒症狀，有效成分48小時即自然排出體外。

在感冒或受風寒時，常會出現惱人的鼻塞、咽喉痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、肌肉酸痛等不舒服的症狀，繼而影響食慾與日常作息，因而出現疲勞、倦怠感。如未能及早治療，常易導致脆弱的呼吸道進一步受感染而較難治癒。普拿疼伏冒加強錠係由葛蘭素史克(GlaxoSmithKline) 公司針對這些感冒症狀精心研製而成，含醫師常用處方成分，不含阿斯匹靈，不嗜睡，並且添加二顆檸檬的維生素C，在感冒症狀出現時及早服用，能有效解除感冒症狀，儘早回復日常作息，能幫助身體恢復健康

根據文獻資料，感冒病毒不僅會隨著噴嚏咳嗽四處飄揚，也可以依附在任何物體表面上，在體外存活長達24小時，藉由接觸傳染給他人，所以出現感冒症狀時，請記得遮住口鼻、經常清潔雙手，避免傳染給他人。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分	Acetaminophen	Phenylephrine HCl	Noscipine	Terpin Hydrate	Caffeine	Vitamin C
含量	500mg	10mg	15mg	33.33mg	25mg	63.33mg

其他成分(賦形劑)

Corn starch, Gelatin, Alginic acid, Magnesium stearate, Talc, Docusate sodium, FD & C yellow # 10, FD & C yellow # 6, Purified water

2 用途(適應症)

緩解感冒之各種症狀 (鼻塞、咽喉痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、肌肉酸痛)。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 12歲以下。

3.2.2 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

3.2.3 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。

3.2.4 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺腫大引起排尿困難。

3.2.5 正在使用抗凝血劑（如Warfarin）的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

3.3.3 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不要服用本藥超過七日。

3.4.5 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)或8錠會發生肝臟損害。

3.4.6 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen（Paracetamol）有急性肝衰竭的風險。

3.4.7 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

4 用法用量

12歲以上	每4-6小時一錠，24小時不可超過4錠。
12歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

- 5.2.2 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- 5.2.3 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- 5.2.4 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- 5.2.5 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg) 或8錠]，或服藥後出現下列症狀：
胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- 5.2.6 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

6 包裝

黃白兩色雙層錠。8~1000錠鋁箔盒裝。

7 儲存方式

25°C 以下密封乾燥貯存。

- 錠劑表層可能因時間與儲藏環境差異偶有褐色斑點產生，此為表層維生素C氧化之自然現象，並不會影響產品功效。
- 本產品鋁箔如有破損，請勿使用並退回藥商。

製造廠

STERLING DRUG (MALAYA) SDN. BHD. LOT 89, JALAN ENGGANG, AMPANG/ HULU KELANG
INDUSTRIAL ESTATE, 68000 AMPANG, SELANGOR, MALAYSIA.

藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司
臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓