

普拿疼伏冒日夜膜衣錠

Panadol Day & Night Cough, Cold & Flu F.C. Caplets

衛署藥製字 第 048683 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

緩解感冒症狀

針對日夜的不同需求，有效緩解感冒症狀。白天不嗜睡，晚上好休息。

普拿疼伏冒日夜膜衣錠係由葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)公司針對感冒時日夜不同的需求，研製而成，是多重療效的綜合感冒藥，能緩解感冒之各種症狀，包括：

- 頭痛、咽喉痛
- 鼻塞、流鼻水、打噴嚏
- 咳嗽
- 發燒、畏寒
- 全身酸痛如：肌肉酸痛

幫助你恢復正常規律作息

很多人感冒時的困擾是白天感覺疲勞，相反地晚上卻睡不好。

普拿疼伏冒日夜膜衣錠突破以往配方，設計兩種藥劑，讓你白天服用不會嗜睡的日錠，可以改善感冒症狀，讓你能正常從事日常活動；晚上睡前服用夜錠，在良好的睡眠品質中舒緩感冒症狀，隔日早晨時仍可以展開活力的一天。維持規律的作息，在獲得充分的休息後，可以幫助身體較快回復健康狀態。

α 橘色的日錠

含不嗜睡配方，緩解感冒症狀，維持正常工作

α 灰色的夜錠

進一步緩解感冒症狀，恢復身體日常作息

普拿疼伏冒日夜膜衣錠能緩解影響白天工作及夜晚睡眠的頻繁咳嗽。

有效的配方

普拿疼伏冒日夜膜衣錠的處方設計是以針對感冒所產生的症狀對症下藥：

- 採用 Phenylephrine HCl 做為緩解鼻塞的成分
- 採用 Dextromethorphan 作為有效止咳的成分
- 不含阿斯匹靈

作用

Acetaminophen：

是止痛退燒成分，對胃無刺激性。可緩解發燒、頭痛、咽喉痛以及感冒引起的全身酸痛，像肌肉酸痛、關節痛。

Dextromethorphan HBr：

是止咳成分。能幫助緩解咳嗽、降低咳嗽頻率與嚴重程度。本品成分尤其適用於可能影響日間工作或夜晚睡眠的頻繁性咳嗽。

Phenylephrine HCl：

是鼻塞解除劑。可幫助收縮充血之鼻黏膜微血管，治療鼻塞，流鼻涕和鼻水；使鼻道暢通，呼吸順暢。

Diphenhydramine HCl：

幫助緩解流鼻水、打噴嚏等症狀。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每一錠含有	日錠	夜錠
Acetaminophen	500mg	500mg
Dextromethorphan HBr	15mg	15mg
Phenylephrine HCl	10mg	10mg
Diphenhydramine HCl	—	25mg

1.2 其他成分(賦形劑)

日錠賦形劑：Cellulose microcrystalline; Pregelatinized starch; Croscarmellose sodium; Povidone; Stearate acid; Silicon dioxide; Opadry (peach OY-B-33127)

夜錠賦形劑：Cellulose microcrystalline; Pregelatinized starch; Croscarmellose sodium; Povidone; Stearate acid; Silicon dioxide; Opadry (gray OY-B-27600)

2 用途(適應症)

緩解感冒之各種症狀 (頭痛、咽喉痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、打噴嚏、畏寒、發燒、關節痛、肌肉酸痛) 。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 哺乳婦不建議使用夜錠。
3. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、血清素回收抑制型的抗憂鬱劑(SSRI) 或其他抗憂鬱、抗精神疾病、情緒症狀、巴金森氏症藥物的人。
4. 服用上述單胺氧化酶抑制劑(MAOI)等藥物期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
5. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽或呼吸困擾的人。
6. 正在使用其他含Diphenhydramine或其他抗組織胺藥品的人。
7. 未滿2歲的孩童。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 2歲以上未滿6歲。
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 曾診斷為下列疾病的人:心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難。
4. 正在服用或最近曾服用降血壓藥品或交感神經作用劑。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 孕婦、可能懷孕婦女。
2. 哺乳婦（使用日錠前）。
3. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
4. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
5. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

3.4 其他使用上注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠。
4. 不要服用本藥超過七日。
5. 服用過量的Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
6. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
7. 夜錠可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
8. 鎮靜藥或安眠藥會加重嗜睡。
9. 不要同時飲用含酒精之飲料，酒精會加重嗜睡。
10. Acetaminophen可能引起嚴重皮膚反應。

4 用法用量

年齡	日錠	夜錠
成人及12歲以上孩童	一日3次，每次1錠 (上午、中午、下午)	每日晚上睡前服用 每次1錠
9歲以上未滿12歲	一日3次，每次1/2錠 (上午、中午、下午)	每日晚上睡前服用 每次1/2錠
6歲以上未滿9歲孩童	使用前請洽醫師	
未滿6歲之孩童	請勿使用本產品，並請洽醫師診治	

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、起水疱。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
5. 服用過量[每日超過 Acetaminophen 4,000 毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀: 胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6. 有過敏情形，例如: 臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

6 包裝

8-1000錠PVC-ALU鋁箔盒裝

7 儲存方式

請存放於25°C以下乾燥陰涼及兒童無法取得之處

製造廠

輝瑞生技股份有限公司新竹廠

新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之1號

藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓