

# 普拿疼伏冒治咳膜衣錠

## Panadol Cold and Flu Cough F.C. Caplets

衛署藥製字 第 051386 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

### 有效制伏咳嗽與喉嚨痛的症狀

感冒時，若同時引發咳嗽症狀，不但自己很不舒服，還會擔心感冒病毒隨著咳嗽傳染給別人。普拿疼伏冒治咳膜衣錠，不含阿斯匹靈，能有效制伏咳嗽與喉嚨痛，並緩解發燒、鼻塞、頭痛、肌肉酸痛之感冒症狀。

## 1 成分

### 1.1 有效成分及含量

有效成分	Acetaminophen	Phenylephrine HCl	Dextromethorphan HBr
含量	500 mg	10 mg	15 mg

### 1.2 其他成分(賦形劑)

Cellulose microcrystalline; Pregelatinized starch; Croscarmellose sodium; Povidone; Stearic acid; Silicon dioxide; Opadry (peach OY-B-33127)

## 2 用途(適應症)

緩解感冒之各種症狀 ( 頭痛、咽喉痛、咳嗽、鼻塞、畏寒、發燒、關節痛、肌肉酸痛 )。

## 3 使用上注意事項

### 3.1 有下列情形者，請勿使用

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、血清素回收抑制型的抗憂鬱劑(SSRI) 或其他抗憂鬱、抗精神疾病、情緒症狀、巴金森氏症藥物的人。
3. 服用上述單胺氧化酶抑制劑(MAOI)等藥物期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
4. 未滿6歲。

### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 6歲以上未滿9歲。
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
4. 曾診斷為下列疾病的人:心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難。
5. 正在服用或最近曾服用降血壓藥品或交感神經作用劑。

### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 可能懷孕婦女、孕婦、哺乳婦。
2. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
3. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

### 3.4 其他使用上注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用劑量。
4. 不要服用本藥超過七日。
5. 服用過量的Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
6. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
7. Acetaminophen可能引起嚴重皮膚反應。

## 4 用法用量

年齡	用法用量
成人及12歲以上	一日3至4次，每次1錠
9歲以上未滿12歲	一日3至4次，每次1/2錠
6歲以上未滿9歲	使用前請洽醫師診治
未滿6歲	請勿使用本產品，並請洽醫師診治

## 5 警語

### 5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、起水疱
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

### 5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有復發現象，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，這些可能是情況變嚴重的徵兆。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。

4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
5. 服用過量[每日超過 Acetaminophen 4,000 毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：  
胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

## 6 包裝

8-1000錠PTP鋁箔盒裝

## 7 儲存方式

請存放於25°C以下乾燥陰涼及兒童無法取得之處

## 製造廠

輝瑞生技股份有限公司新竹廠

新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-1號

## 藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓