

普拿疼伏冒熱飲散劑加強配方

Panadol Cold & Flu Hot Remedy Powder extra formula

衛署藥製字 第 050881 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

伏冒熱飲加強配方的主要成分能在體內快速作用

30分鐘之內有效擊退感冒症狀

在感冒或受風寒時，常會引起惱人的鼻塞、咽喉痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、肌肉酸痛等不舒服的症狀，如未能及早治療，常易導致脆弱的呼吸道進一步受感染而較難治癒。普拿疼伏冒熱飲加強配方係由葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline) 公司針對這些感冒症狀精心研製而成，添加二顆檸檬的維生素C，用水沖泡後溫熱的喝，快速且有效制伏感冒症狀，不含阿斯匹靈，不嗜睡，在感冒症狀出現時及早服用，能幫助身體儘速恢復健康。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分	含量	主要作用
Acetaminophen	500 mg	對胃較無刺激性之鎮痛、解熱劑，可緩和頭痛、咽喉痛、四肢酸痛及發燒。
Caffeine Anhydrous	25 mg	咖啡因。
Phenylephrine Hydrochloride	10 mg	具收縮鼻黏膜血管、抑制充血、鼻腔腫脹功效。能緩解鼻塞，促進鼻道暢通。
Dextromethorphan Hydrobromide	15 mg	止咳成分。
Ascorbic Acid	63.33 mg	維生素C。

其他成分(賦形劑)

Sucrose (refinery), sucrose, citric acid (anhydrous), sodium citrate, starch maize, aspartame, orange 860293 TD0594, lemon flavours 610399E, saccharine sodium, orange 51239A, natural curcumin E100, aerosil 200.

2 用途(適應症)

緩解感冒之各種症狀 (鼻塞、咽喉痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.2 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
- 3.1.3 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 12歲以下。
- 3.2.2 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- 3.2.3 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- 3.2.4 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺腫大引起排尿困難。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 3.3.2 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- 3.3.3 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議劑使用量。
- 3.4.4 不要服用本藥超過七日。
- 3.4.5 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- 3.4.6 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
- 3.4.7 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

4 用法用量

12歲以上	每4-6小時一次，24小時不可超過4次。成人每次1包(5公克)。
12歲以下	請洽醫師診治。

【使用方法】

1. 將一包伏冒熱飲倒入一般杯子或馬克杯中。
2. 慢慢加入半杯溫開水，攪拌均勻後，再依個人喜好加入冷水或溫水至約150C.C. (一般紙杯的八分滿)。

5 警語

- 5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。

5.2.3 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。

5.2.4 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

5.2.5 服用過量[每日超過4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀: 胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

5.2.6 有過敏情形，例如: 臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

6 包裝

5包、8-200包鋁箔袋裝(每包5公克)。

7 儲存方式

30°C 以下，密封貯存

製造廠

聯亞藥業股份有限公司新竹廠

新竹縣湖口鄉中興村光復北路45號

藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓