

普拿疼伏冒綜合鼻炎錠

Panadol Allergy Sinus Tablet

衛署藥輸字 第 025297 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-01-22

有效解除因感冒所引起的各種鼻炎症狀，並且幫助緩解感冒

在季節變化或感冒初期，常會引起惱人的流鼻水、鼻塞、打噴嚏等不舒服的鼻炎症狀。如未能及早緩解，常易導致脆弱的呼吸道進一步受感染。普拿疼伏冒綜合鼻炎錠，不含阿斯匹靈，能夠迅速有效制伏流鼻水、鼻塞、打噴嚏，並緩解發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉酸痛之感冒症狀，幫助身體恢復健康。

1 成分

1.1 有效成分及含量

主成分	每錠中含	主要作用
Acetaminophen	500mg	不刺激胃且有效之解熱鎮痛劑。 可緩解頭痛、肌肉酸痛。
Pseudoephedrine Hydrochloride	30mg	具收縮鼻黏膜血管、抑制充血、鼻腔腫脹功效。 能緩解鼻塞，促進鼻道暢通並恢復自由舒適的呼吸。
Chlorpheniramine Maleate	2mg	可緩解流鼻水、打噴嚏等不舒服症狀。

其他成分(賦形劑)

Starch – pregelatinised maize, Starch - maize, Talc – purified, Stearic acid, Silicon dioxide, Povidone, Sodium benzoate

2 用途(適應症)

緩解感冒之各種症狀 (流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI 兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

3.1.3 有心臟病或高血壓。

3.1.4 正在服用抗生素，如Furazolidone、Linezolid。

3.1.5 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、鼻塞、抗過敏、止痛或退燒等藥品，或安非他命類興奮劑（用於治療注意力不足）、食慾抑制劑、或其他含有抗組織胺的藥物（用於治療過敏，或用於感冒、止咳藥物）。

3.1.6 同時服用任何其他含Acetaminophen用以緩解疼痛、發燒、感冒症狀或幫助睡眠的處方藥或非處方藥藥品。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 12歲以下。

3.2.2 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.2.3 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

3.2.4 若有下列情形時，您可能需要避免併用本藥或限制所服用之Acetaminophen劑量。

- 有肝、腎問題。
- 體重過輕或營養不良。
- 經常飲酒。

3.2.5 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。

3.2.6 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病（血糖過高）、甲狀腺機能亢進、因前列腺腫大引起排尿困難。

3.2.7 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼（眼壓過高）的人。

3.2.8 若有下列情形：

- 不規則心跳
- 思覺失調（嚴重心理健康問題，病人會脫離現實且無法清楚思考及判斷）
- 有嗜鉻細胞瘤（一種在腎臟附近的罕見腎上腺腫瘤）
- 癲癇
- 準備進行手術，建議於手術前24小時停藥。
- 有嚴重感染、嚴重營養不良、嚴重體重過輕、或長期重度飲酒的人，有可能增加代謝性酸中毒的風險。代謝性酸中毒的徵兆包含：
 - 深且急促的呼吸困難
 - 噁心、嘔吐
 - 食慾不振

如有合併上述這些症狀，請立即洽詢醫師。

3.2.9 正在服用下列藥物：

- 控制血壓的藥物，如乙型腎上腺素阻斷劑。
- 治療焦慮、或幫助入眠的藥物。
- 治療癲癇之含Phenytoin藥物。
- Warfarin或類似藥物以稀釋血液。

3.2.10 兒童及老年人較容易出現不良反應。照顧者需注意不應將此藥提供給意識混亂的老

年人。若您超過60歲，請於使用前諮詢醫師，因為出現不良反應的可能性較高。

3.3 其他使用上注意事項

- 3.3.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.3.2 避免陽光直射。
- 3.3.3 勿超過建議使用量。
- 3.3.4 不要服用本藥超過七日。
- 3.3.5 本藥含Acetaminophen (Paracetamol)。
- 3.3.6 服用過量的Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen 超過4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。
- 3.3.7 若服用超過建議劑量，因肝衰竭的風險，應立即就醫，即使並未感覺不適。過量之症狀有心悸、排尿困難及癲癇。毒藥物防治諮詢中心之24小時諮詢服務專線：(02) 2871 7121。
- 3.3.8 請勿超過建議劑量，因為可能會對肝臟造成嚴重傷害。
- 3.3.9 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
- 3.3.10 可能引起嗜睡、暈眩、視覺模糊現象。確定無影響後才可駕車或操作器械。
- 3.3.11 本產品所含的Pseudoephedrine劑量可能會引起運動禁藥管制檢測的陽性反應。
- 3.3.12 服用本藥時可能會發生：鎮靜、嗜睡、緊張、難以入睡、疲倦、暈眩、難以專心、缺乏動作協調性、頭痛、視覺模糊、口乾、焦慮、顫抖、噁心及嘔吐。幻覺曾罕見得被通報過，特別是出現於小孩身上。
- 3.3.13 請閱讀並遵照說明書指示。

4 用法用量

12歲以上	每4-6小時一次，24小時不可超過4次。
12歲以下	請洽醫師診治。

- 請服用最低有效劑量及最短所需期間來緩解症狀。
- 勿超過建議使用量或使用頻率。
- 不要服用本藥超過七日。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。

5.2.3 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。

5.2.4 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

5.2.5 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀: 胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

5.2.6 有過敏情形，可能會很嚴重，例如：臉、嘴巴、喉嚨的腫起，造成呼吸困難、蕁麻疹（搔癢且伴隨隆起的疹塊）、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐、感覺頭暈，可能會導致失去意識。這些情形很罕見。

5.2.7 若有下列情況：

- 突然的胸痛或不適，伴隨著呼吸困難。
- 突然的腹痛，或糞便中有血。
- 突然且劇烈的頭痛，伴隨想吐的感覺或視覺出現干擾。

5.2.8 若有下列情況：

- 排尿困難。這較易發生於前列腺腫大之男性。
- 服用後引起疹子或脫皮，或口腔潰瘍。
- 曾經因阿斯匹靈 (aspirin) 或非類固醇消炎藥物 (non-steroidal anti-inflammatories) 引起呼吸困難者，且因本藥引起類似反應。
- 不明原因的瘀傷或出血。

6 包裝

6-28錠PTP鋁箔盒裝

7 儲存方式

儲存於30°C以下。

製造廠

ASPEN PHARMA PTY LTD.

286-302 FRANKSTON-DANDENONG ROAD DANDENONG
SOUTH VIC 3175 AUSTRALIA

藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份
有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓