

普拿疼止痛加強錠

Panadol Extra with Optizorb

衛部藥輸字 第 026245 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-10-29

OPTIZORB技術

緩解較強疼痛、迅速有效

不刺激胃

24小時排出體外 (>95%)

作用

普拿疼止痛加強錠經臨床證實為一有效之鎮痛、解熱劑。其鎮痛、解熱效果與阿斯匹靈相等，但不似阿斯匹靈或含阿斯匹靈之藥品會導致許多副作用。

普拿疼止痛加強錠適用於解除各種疼痛，例如：頭痛、月經痛、肌肉骨骼疼痛、肌肉痛及神經痛等。同時亦可用於伴有不適感及發燒之病症的止痛解熱，例如感冒、牙科手術及拔牙後。普拿疼止痛加強錠含咖啡因，口服後，可溫和地刺激中樞神經，使人保持清醒且對疲勞的人有提神的功效。咖啡因經常與乙醯胺酚合併使用，當作迅速有效的頭痛治療劑。經文獻可知，與單純含有Acetaminophen 500mg的藥錠相比，併含咖啡因可提供的止痛強度預測為增加37%。

產品特性

普拿疼止痛加強錠的OPTIZORB技術，可促進本藥快速崩散、快速溶解，且與一般含乙醯胺酚及咖啡因的錠片相比，服用30分鐘後吸收速度快3倍，提早15分鐘到達人體血中，快50%發揮療效，但是血中的乙醯胺酚及咖啡因的總吸收量沒有差別，並於24小時後排出體外(超過95%)。

普拿疼止痛加強錠在空腹時服用可在10分鐘開始發揮療效，在餐後服用時也可以在22分鐘後發揮療效。

1 成分

1.1 有效成分及含量

Acetaminophen(乙醯胺酚) 500毫克及Caffeine (咖啡因) 65毫克。

1.2 其他成分(賦形劑)

Starch Pregelatinised, Calcium Carbonate, Alginate Acid, Purified Water, Croscopolvidone, Povidone, Opadry White YS-1-7003, Sodium Parabens, Magnesium Stearate, Carnauba Wax.

2 用途(適應症)

退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因藥物或因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.1.3 12歲以下。

3.1.4 正在服用其他含Acetaminophen (Paracetamol)的處方或非處方藥治療疼痛、發燒、感冒徵狀或幫助睡眠的人。

3.1.5 正在服用鋰鹽(Lithium)藥物。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 成人連續服用本藥超過7天，症狀未緩解的人。

3.2.2 現正服用Warfarin等抗凝血劑的人。

3.2.3 有肝腎臟問題、體重過輕或營養不良、經常飲酒的人。您可能需要避免併用本藥或限制所服用之Acetaminophen劑量。

3.2.4 有嚴重感染、嚴重營養不良、嚴重體重過輕或長期重度飲酒的人可能增加代謝性酸中毒的風險。

3.3 其他使用上注意事項

3.3.1 請閱讀並遵照仿單說明書指示。

3.3.2 需要時服用，且用藥時程越短尤佳。

3.3.3 須置於兒童眼界未及且接觸不到之處。為防止兒童誤食請妥善保管。避免陽光直射。

3.3.4 勿超過建議使用量，可能會對肝造成嚴重損傷。

3.3.5 避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

3.3.6 本藥含 Acetaminophen，服用過量的 Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen超過4000毫克(8錠)會發生肝臟損害。

3.3.7 本藥每錠含0.1736毫克的鈉。本藥賦形劑 Sodium parabens 可能會引起過敏反應。

3.3.8 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

3.3.9 偶有過敏反應。在建議使用量下服用，罕有副作用發生。

4 用法用量

醫師藥師藥劑生指示藥品

成人及12歲以上	每次1-2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。發燒或疼痛時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，兩次間隔請勿短於4小時，每24小時內不可超過4次。請勿超過建議劑量(4000毫克; 8錠)。請勿併服其它含Acetaminophen(乙醯胺酚)的藥品。
12歲以下	請勿使用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、脫屑、發癢、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	口腔潰瘍、未預期創傷或出血

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 曾有服用阿斯匹靈或其他非類固醇抗發炎藥品而出現呼吸困難，且服用本藥出現類似症狀的人。

5.2.3 有過敏情形，例如：臉、唇舌及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

5.2.4 有代謝性酸中毒徵兆(包含：深且急促的呼吸困難、噁心嘔吐。食慾不振)。

5.2.5 服用過量(每日超過4000毫克：8錠)，雖然沒有任何徵兆產生但有肝衰竭風險，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。若服用超過建議劑量：可撥打藥物防治諮詢中心之24小時諮詢服務專線 (02 2871 7121)。

6 包裝

2~1000錠塑膠瓶裝、ALU-PVC鋁箔盒裝

ALU-PET-PVC鋁箔盒裝 (本品使用兒童安全包裝，加厚鋁箔設計使兒童不易開啟，以防止誤食。)

7 儲存方式

30°C 以下。

製造廠

GLAXOSMITHKLINE
DUNGARVAN LIMITED

KNOCKBRACK, DUNGARVAN, CO. WATERFORD, IRELAND

STERLING DRUG (MALAYA) SDN.
BHD.

LOT 89, JALAN ENGGANG, AMPANG/HULU KELANG
INDUSTRIAL ESTATE, 68000 AMPANG, SELANGOR, MALAYSIA

新竹物流股份有限公司

新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號

藥商

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓