

普拿疼速效膜衣錠

PANADOL ACTIFAST TABLETS

衛署藥輸字 第 023761 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

吸收比一般普拿疼錠2倍快速

作用

普拿疼速效膜衣錠為白色膜衣錠，含有Acetaminophen (乙醯胺酚)，為一解熱鎮痛劑。普拿疼速效膜衣錠的主成分Acetaminophen (乙醯胺酚)在人體內吸收進入血液循環的速度比一般乙醯胺酚錠兩倍快速，因此能更快到達痛源。

1 成分

1.1 有效成分及含量

Acetaminophen(乙醯胺酚) 500mg。

1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium bicarbonate, Microcrystalline cellulose, Starch pregelatinised, Opadry II White, Maize starch, Magnesium stearate, Povidone, Potassium sorbate, Carnauba wax.

2 用途(適應症)

退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因藥物或因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 正在服用其他含Acetaminophen (Paracetamol)的處方或非處方藥治療疼痛、發燒、感冒徵狀或幫助睡眠的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 12歲以下。

3.2.2 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

3.2.3 現正服用Metoclopramide或Domperidone以治療頭暈及嘔吐、Cholestyramine以治療高膽固醇或Warfarin等抗凝劑的人。

3.2.4 有肝腎臟問題、體重過輕或營養不良、經常飲酒的人。您可能需要避免併用本藥或限制所服用之Acetaminophen劑量。

3.2.5 有嚴重感染、嚴重營養不良、嚴重體重過輕或長期重度飲酒的人可能增加代謝性酸中毒的風險。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。考量以最小建議劑量、最短使用時間服用本藥。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 請閱讀並遵照仿單說明書指示。

3.4.2 本藥每錠含173毫克的鈉，需低鈉飲食的人不適用本藥。

3.4.3 需要時服用，且用藥時程越短尤佳。

3.4.4 須置於兒童眼界未及且接觸不到之處。為防止兒童誤食請妥善保管。避免陽光直射。

3.4.5 勿超過建議使用量，可能會對肝造成嚴重損傷。

3.4.6 本藥含 Acetaminophen，服用過量的 Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen超過4000毫克(8錠)會發生肝臟損害。

3.4.7 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

3.4.8 本藥適合大多數人使用，有些人偶有過敏反應發生，如皮膚癢或噎氣也偶爾會發生，但停藥後副作用即會消失。在建議劑量下服用，罕有副作用發生。

4 用法用量

醫師藥師藥劑生指示藥品

成人及12歲以上	發燒或疼痛時服用，每次1-2錠，若症狀持續，則每4~6小時可重複服用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。 兩次間隔請勿短於4小時，每24小時內不可超過4次。 請勿超過建議劑量(4000毫克：8錠)。
12歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、脫屑、發癢、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	口腔潰瘍、未預期創傷或出血

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況發生。

5.2.2 曾有服用阿斯匹靈或非類固醇抗發炎藥品而出現呼吸困難，且服用本藥出現類似症狀的人。

5.2.3 有過敏情形，例如：臉、唇舌及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏

、搔癢以及嘔吐。

5.2.4 有代謝性酸中毒徵兆(包含:深且急促的呼吸困難、噁心嘔吐。食慾不振)。

5.2.5 使用過量(每日超過4000毫克; 8錠)，雖然沒有任何徵兆產生但有肝衰竭風險，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。若服用超過建議劑量：可撥打毒藥物防治諮詢中心之24小時諮詢服務專線 (02 2871 7121)。

5.2.6 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

6 包裝

2~1000錠ALU-PVC鋁箔盒裝

ALU-PET-PVC鋁箔盒裝 (本品使用兒童安全包裝，加厚鋁箔設計使兒童不易開啟，以防止誤食。)

7 儲存方式

30°C 以下。

製造廠

GLAXO SMITH KLINE
DUNGARVAN LIMITED

KNOCKBRACK, DUNGARVAN, CO. WATERFORD, IRELAND

STERLING DRUG (MALAYA) SDN.
BHD.

LOT 89, JALAN ENGGANG, AMPANG/HULU KELANG
INDUSTRIAL ESTATE, 68000 AMPANG, SELANGOR, MALAYSIA

藥商

英商葛蘭素史克消費保健用品股份
有限公司台灣分公司

臺北市中正區忠孝西路一段66號24樓